



Chef de service

Pr Simone Denis

Équipe médicale

Dr Raymond Lacroix

Praticien hospitalier

Dr Yvette Rolland

Praticien hospitalier

Dr Frédéric Schmitt

Chef de clinique assistant

Secrétariat

Tél. : 01 99 00 14 67

Fax : 01 99 00 96 81

secretariat.cot@hsa-neuilly-sur-seine.fr

Consultations

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h00

N° séjour : 240245305 IPP : 3159944064

Réf. : CRO / COT

Neuilly-sur-Seine, le 16/08/2024

Madame KERBRAT Aurélie

Née le 01/09/1965 à Évreux (27)

INS (NIR) : 2 65 09 27 229 087 37

69 rue des Frères Lumière

92380 GARCHES

Tél. : 01 99 00 66 66

COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

Date de l'intervention	14/08/2024
Opérateur	Dr Raymond Lacroix
Aide opératoire	Odette Ferreira (interne)
Anesthésiste	Dr Nicolas Bourdon
Salle	Bloc A - salle 1

Rappel clinique : Fracture isolée déplacée intertuberculaire de la malléole externe droite chez une femme âgée de 58 ans, auparavant autonome.

Date de l'intervention : 14/08/2024

Diagnostic : Fracture fermée isolée de la malléole externe droite

Chirurgien : Dr Raymond Lacroix

Intervention :

Sous Rachianesthésie en décubitus dorsal sur table ordinaire

Coussin sous la fesse droite pour neutraliser la rotation externe de la hanche droite

Garrot pneumatique gonflé à 350 mmHG

Installation stérile et badigeonnage selon CLIN et la SOFCOT

Checklist selon HAS 2018

Abord externe de la cheville droite

Exposition du foyer de fracture : fracture simple transversale intertuberculaire de la malléole externe

Évacuation de l'hématome fracturaire

Réduction première par Davier réducteur et mise en place d'une vis perpendiculaire au foyer de fracture de type vis corticale de 3,5 mm de diamètre et de longueur 25 mm.

Réduction + ostéosynthèse à ciel ouvert par une plaque anatomique de type LCP

Contrôle scopique : ok

Lâchage du garrot

Hémostase soigneuse et lavage abondant

Fermeture plan par plan

Pansement stérile

Confection d'une Attelle botte postérieure

Suites postopératoires :

Radiographie de contrôle de la cheville droite (face + profil)

Verticalisation JO sans appui du côté opéré avec 02 cannes béquilles

LOVENOX 4000 UI 1e inj/j en SC pendant 45 jours

Perfalgan 1g*3/j toutes les 8 heures

Changement du pansement 1j/2 et ablation des fils à J14 postopératoire tout en gardant l'attelle

Patiente sortante ce jour après contrôle biologique NFS-Plaquettes-Ionogramme sanguin-Urée-Créatinine sanguine, indolence totale et résolution complète des effets de l'anesthésie.

Dr Raymond Lacroix



Praticien hospitalier - Chirurgie orthopédique et
traumatologique

RPPS : 10490187597

Compte rendu validé électroniquement le 14/08/2024

Copie à : Dr Dominique Lemaire (médecin traitant) ; Dossier patient